

## БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ



-1-

Заболяване	Задължително изследване	Диагноза	Възможни признания на заболяването
Гонорея (Трипер)	Да Веднъж на 6 седмици	Изследване на секрет  Изследване на урина 	(+) (+) (+) Жълтеникаво, миризливо течение от пениса, вагината или ануса  (+) (+) Болки, сърбеж или парене при уриниране  Болки в гърлото след орален секс
Сифилис (Луес)	Да Веднъж на 12 седмици	Изследване на кръв 	(+) (+) (-) Възли или язви на пениса, вагината, ануса или устата/гърлото Увеличени лимфни възли, кожен обрив
СПИН/ХИВ	Да Веднъж на 12 седмици	Изследване на кръв 	Често без симптоми дълго време
Хламидия	Не	Изследване на секрет  Изследване на урина 	(+) (+) (+) Жълтеникаво, миризливо течение от пениса, вагината или ануса  (+) (+) Болки, сърбеж или парене при уриниране  Болки в гърлото след орален секс  Болки при секс
Хепатит В или С (заразно възпаление на черния дроб)	Не	Изследване на кръв 	Често без симптоми Жълтеница

### Важни указания:

- При позитивен резултат на гонорея, сифилис или СПИН, здравната книжка (карта) бива отнета.
- Гинекологични изследвания са абсолютно необходими! Задължителното изследване не включва например цитонамазка. За мъжете са важни допълнителни урологични изследвания (при уролог). Съвет: поне веднъж годишно; например [www.docfinder.at](http://www.docfinder.at)
- Моля потърсете лекар при появата на всеки от признаките на заболяване!
- В Австрия има добри възможности за лечение на тези болести.
- При някои заболявания, партньорът/партньорката също трябва да се подложи на лечение!
- Има ваксини за защита от хепатит В и ЧПВ (човешки папилома вирус), които се заплащат. Попитайте лекаря си!

## НАЧИНИ ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ и ЗАЩИТА

Начини за заразяване	Възможни заболявания	Зашита от заразяване
Вагинален секс 	СПИН, сифилис, хепатит В и С, гонорея, хламидия	Презерватив 
Анален секс 	СПИН, сифилис, хепатит В и С, гонорея, хламидия	Презерватив 
Орален секс 	СПИН, сифилис, хепатит В и С, гонорея, хламидия	Презерватив, „Латексова преграда“  
Целувка 	Сифилис, хепатит В	Без целувки  
Ръка, секс играчка 	Сифилис, гонорея, хламидия	Презерватив, „Латексова преграда“, Латексови ръкавици   
Кръв 	СПИН, хепатит В и С	Презерватив, Латексови ръкавици, без кръвен контакт   

**„Духане или лизане“ без защита = риск от заразяване!!! (например: сифилис, ЧПВ,...)**

### Правилно използване на презерватив:

- Пенисът трябва да е твърд, когато се поставя презерватива!
- Кожата се издърпва, върхът на презерватива се натиска пръсти и така се поставя върху пениса.
- Върхът на презерватива се държи, докато презервативът се нанизва!
- Презервативът винаги се развива до края!
- Презервативът се маха веднага след изпразване, преди пенисът да омекне!



При въпроси, моля обърнете се към **консултативен център** за секс работнички! Там ще бъдете **бесплатно и поверително** подпомогнати и посъветвани. За адреси, моля вижте брошурите „Sexwork-Info“! Тези брошюри може да получите например в австрийски (регионални-) здравни институции!

Метод	Механично		Хормонално	Химично		Естествено
Конtraceпtивно средство	♂ ○ Презерватив	♀ ○ Диафрагма ○ Цервикална шапка ○ И т.н.	♀ ○ Таблетки ○ Тримесечна контрацептивна инжекция ○ Конtraceпtивни лепенки ○ Хормонална спирала ○ Конtraceпtивен пръстен ○ Противозачатъчен имплант	♀ ○ Медна спирала	♀ ○ Свещички ○ Кремове ○ Таблетки	♀ ○ Измерване на температурата ○ Метод на цервикалната слуз ○ Календар
Описание	Преди полов акт се поставя на твърд пенис.  Предотвратява бременност и заразяване с болести, предавани по полов път.	Преди полов акт се поставя във вагината пред шийката на матката.  Предотвратява достигането на сперматозоиди в матката.	Налични при гинеколог. Чрез хормонални промени в тялото, предотвратява възможността за бременност.	Поставя се от гинеколог в матката. Предотвратява внедряването на оплодена яйцеклетка .  Премахването е възможно при гинеколог.  Смяна след 3-5 год.	Преди полов акт се поставя във вагината.  Убива сперматозоидите.	Определяне на фертилни и нефертилни дни.  При фертилни дни е необходимо допълнително контрацептивно средство, например презерватив.
Как и къде налични?	○ Секс магазин ○ Супермаркет ○ Дрогерия ○ Аптека	○ Препоръчва се посещение при гинеколог ○ Аптека	○ Посещение при гинеколог е необходимо	○ Посещение при гинеколог е необходимо	○ Аптека	
Сигурност при ПРАВИЛНО използване	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Зашита от венерически болести	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	

**„Хапче след секс“ – само при спешен случай:** трябва да се вземе най-късно 72 часа след полов акт – и е налично без рецепт в аптеките и гинекологичните клиники (в болницата). **Не защитава** от болести, предавани по полов път и СПИН/ХИВ!

**Менструални гъби – Дамски превръзки - Тампони:** не предпазват от болести, предавани по полов път и СПИН, **също така** и от бременност!

Издател: Работна група „Проституция“ (Подработна група на координационния механизъм за борба с трафик на хора - Task Force Menschenhandel. Информацията предоставена в тази публикация, въпреки внимателната ѝ подготовка, не дава гаранция относно нейната вярност и точност. Поемането на отговорност от страна на издателката е изключено.

**Илюстрации:** с приятелското разрешение и подкрепа от Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/ Deutschland ([www.bzga.de](http://www.bzga.de)).