

luesz / szifilisz

A **luesz, szifilisz vagy vérbaj** nemi úton terjedő fertőző betegség, melynek kórokozója egy baktérium és kezeletlenül később szövődményeket okozhat, vagy halálos kimenetelű lehet.

A szifilisz fertőzésre **vaginális (hüvelyi), anális (végbélnyíláson keresztüli)** vagy **orális (szájon keresztüli)** nemi érintkezés útján kerülhet sor.

Tünetek:

10 – 90 nappal a fertőzés után (a kórokozó behatolási helyén, melyet gyakran figyelmen kívül hagynak) egy fájdalommentes fekély alakul ki, amely később heg nélkül begyógyul.

Kezeletlenül a betegség tovább terjed, gyakorlatilag minden szervet megtámadhat.

A terhesség alatti szifilisz fertőzés átterjedhet a magzatra.

Diagnózis:

A betegség vérvizsgálattal mutatható ki.

Kezelés:

A kezelés antibiotikumokkal történik (injekciók útján).

Ha egyszer már átesett szifilisz fertőzésen, bizonyos vértesztek pozitívak maradnak. Ezért a vérvizsgálatra mindig hozza magával az utolsó leletet.

Használjon óvszert!!

- **Kérjük, ezzel a beutalóval keresse fel azonnal a bőrgyógyászatot.**
Útleírás a másik oldalon.
- **A kezelés után hozza magával az igazolást / rendelőintézeti lapot (Ambulanzkarte).**